

ТРОВАЊА КОД ДЕЦЕ БИЉКАМА И ГЉИВАМА

...И КАКО ИХ
СПРЕЧИТИ



ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
БЕОГРАД



Београд
www.beograd.rs

ДАЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

**Тровања изазвана
биљкама и гљивама код
деце чешћа су него што
се претпоставља -
готово свако друго
тровање малишана у
Србији потиче управо од
конзумације наизглед
безопасних биљака и
печурака**

У КОМ УЗРАСТУ НАЈЧЕШЋЕ ДОЛАЗИ ДО ТРОВАЊА?

**Од друге до пете године
живота**

ЗБОГ ЧЕГА ДОЛАЗИ ДО ТРОВАЊА?

**Деца су по природи
знатижељна и склона
истраживању света око
себе - воле све да пипну,
омиришу, па чак и
пробају!**

ГДЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА БИЉКАМА И ГЉИВАМА?

**Тамо где најчешће
проводе своје време**

дворишта

**дневне
собе**

паркови

**МНОГЕ БИЉКЕ И ГЉИВЕ
ДЕЛУЈУ БЕЗОПАСНО,
АЛИ ИЗАЗИВАЈУ
ТРОВАЊА!**

КАКО ДОСПЕВАЈУ У ОРГАНИЗАМ ДЕТЕТА?

ГУТАЊЕМ

УДИСАЈЕМ

ПРЕКО КОЖЕ

ХЕМИЈСКЕ СУПСТАНЦЕ У
БИЉКАМА КОЈЕ ДОВОДЕ
ДО ТРОВАЊА ЈЕСУ
АЛКАЛОИДИ, А КОД
ГЉИВА МИКОТОКСИНИ!

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА СУ:

- **МУЧНИНА**
- **ПОВРАЋАЊЕ**
- **БОЛОВИ У СТОМАКУ**
- **ДИЈАРЕЈА**
- **ВРТОГЛАВИЦА**
- **ПОЈАВА ОСПЕ**
- **ХАЛУЦИНОГЕНИ СИНДРОМ**
(ХАЛУЦИНАЦИЈЕ+ПОВРАЋАЊЕ
+ДИЈАРЕЈА)

**У ТЕЖИМ
СЛУЧАЈЕВИМА
ДОЛАЗИ ДО
ПРОБЛЕМА СА
СРЦЕМ И
ДИСАЊЕМ!**

ЦИКЛАМА

...колико год лепо и привлачно изгледала, ова биљка може довести до озбиљних симптома тровања. Уколико се прогута корен, долази до болова у стомаку и повраћања.

...јесте биљка која је цела отровна.

Забележени су случајеви тровања од меда уколико су пчеле, које су и правиле ту врсту меда, јеле љихов цвет. Тровање изазива мучнину, дијареју, конфузију, а може и пореметити рад срца.

РОДОДЕНДРОН (АЗАЛЕЈА)



...су биљке које се често налазе у нашим домовима и које су целе отровне. Доводе до отицања језика и усана, а у неким тежим случајевима и до проблема са дисањем.

ФИЛОДЕНДРОН И ДИФЕНБАХИЈА





РИЦИНУС

...спада у изузетно отровне биљке, а највећа концентрација отрова се налази у његовом семену. Изазива црвенило, оспу и свраб по кожи. У најтежим случајевима долази до престанка рада срца.

...овај привлачан цвет је такође изузетно отрован, јер у случају гутања доводи до отицања грла, отежаног дисања, па чак и до парализе мишића и оштећење јетре.

**САМО ДВА СЕМЕНА
ОВЕ БИЉКЕ МОГУ
БИТИ ОТРОВНА!**

КЛИВИЈА

...због своје лепоте чест је украс у баштама. Међутим, ова биљка је изузетно отровна, доводи до наглог пада притиска, ремети чуло вида, а гутање само једног листа може бити смртоносно!



ОЛЕАНДЕР



ЉУТИЋ

**...тровање љутићем
може изазвати
иритацију уста и
слузокоже
дигестивног тракта,
као и повраћање,
пролив и упале
слузокоже црева.**



ЂУРЂЕВАК

**...је нежна и мирисна
пролећна биљка са
ситним белим
звончићима који
симболизују срећу и
чистоту. Ипак, читава
стабиљка је отровна,
изазива мучнину,
вртоглавицу и
озбиљне срчане
сметње.**



ФЛАМИНГОВ ЦВЕТ

**...јесте биљка која се
често може наћи у
кућним условима, а
жвакање и гутање
неких делова доводе
до отицања усана,
језика и стварање
пликова на слузокожи
усне дупње.**

КАКО СПРЕЧИТИ ТРОВАЊА КОД ДЕЦЕ?

**Разговарајте са децом о могућим опасностима
пипкања и грицкања биљака или гљива!**

**Биљке држите ван домашаја деце у свим
просторијама у кући!**

**Уколико не желите
да се одрекнете
зеленила у кући -
замените их
вештачким
биљкама!**

**Док боравите у природи,
носите мајице са дужим
рукавима, као и дуже
панталоне. На тај начин
смањујете могућност
контакта са биљкама!**

**Након контакта са биљкама и
гљивама оперите руке себи и детету!**

**Немојте јести ништа што вам
није познато док боравите у
природи - многе биљке,
попут отровних бобица могу
личити на боровнице, као и
разне гљиве које могу
подсећати на јестиве врсте!**





ПРВА ПОМОЋ КОД ТРОВАЊА

...У СЛУЧАЈУ ДА ДОЂЕ ДО ГУТАЊА БИЉАКА ИЛИ ГЉИВА:

- **Уклоните остатке биљке или гљиве из усне дупље уколико су остали!**

- **Сачувајте остатке биљке или гљиве или повраћног садржаја јер то може бити од великог значаја за даљу анализу и постављање дијагнозе!**

- **Не изазивајте повраћање, осим ако вам то изричито не саветује здравствени радник!**

- **Немојте давати млеко, воду или храну!**
- **Позовите хитну помоћ (194) или дежурну службу токсикологије!**





ПРВА ПОМОЋ КОД ТРОВАЊА

...У СЛУЧАЈУ ДА ДОЂЕ ДО ИНХАЛАЦИЈЕ БИЉАКА ИЛИ ГЉИВА:

- **Удаљите дете од биљке или гљиве!**
- **Позовите хитну помоћ (194) или дежурну службу токсикологије!**

...У СЛУЧАЈУ ДА ДОЂЕ ДО КОНТАКТА КОЖЕ СА БИЉКОМ ИЛИ ГЉИВОМ:

- **Уклоните одећу и темељно исперите водом!**
- **Немојте наносити креме или масти на повређену кожу!**
- **Најбоље би било да позовете хитну помоћ (194) или дежурну службу токсикологије!**



БРОЈЕВИ ЗА ПОМОЋ:

СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ - 194

**Установе које збрињавају отрована лица
на подручју града Београда:**

**ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
(ВМА) - Црнотравска 66
(токсикологија за старије од 14
година)**

- број дежурног токсиколога доступан 24
часа дневно : 011/ 3608-440
- бројеви телефона централе ВМА
011/2661-122, 011/ 2662-755

**УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА,
Тиршова 10 (токсикологија за децу
млађу од 14 година)**

- број телефона централе Клинике 011/
2060-600
- Установа је дежурна сваког парног
датума у месецу

**ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„ДР ВУКАН ЧУПИЋ“, -Радоја Дакића
6-8 (токсикологија за децу млађу од
14 година)**

- број телефона централе Института 011/
3108 -108
- Установа је дежурна сваког непарног
датума у месецу